Kairuku

Kairuku on sukupuuttoon kuollut pingviinilintusuku. Se sisältää kaksi lajia, *K. grebneffi* ja *K. waitaki*. Löydetyt luut on ajoitettu 27–26 miljoonan vuoden taakse, myöhäiselle oligoseenille, ja ne tulevat Uudesta-Seelannista Kokoamu Greensandin muodostumasta.[1][2]

Lähteet

1. Ksepka, D.T. & Fordyce, R.E. & Ando, T. & Jones, C.M.: New fossil penguins (Aves, Sphenisciformes) from the Oligocene of New Zealand reveal the skeletal plan of stem penguins. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 2012, 32. vsk, nro 2, s. 235-254. doi:10.1080/02724634.2012.652051 (https://dx.doi.org/10.1080%2F02724634.2012.652051). Artikkelin verkkoversio (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.2012.652051). (englanniksi)
2. R Ewan Fordyce: Kairuku - a new "giant" Late Oligocene Penguin from New Zealand (http://www.otago.ac.nz/geology/research/paleontology/otago067613.html) *Department of Geology*. University of Otago. Viitattu 25.4.2017. (englanniksi)

Aiheesta muualla

- First Full Look at Prehistoric New Zealand Penguin (https://news.ncsu.edu/2012/02/tpkairuku/) (englanniksi)

Kairuku

Fossiili

Oligoseeni
27–26 Ma

Tieteellinen luokittelu

Domeeni:	Aitotumaiset Eucarya
Kunta:	Eläinkunta Animalia
Pääjakso:	Selkäjänteiset Chordata
Alajakso:	Selkärankaiset Vertebrata
Luokka:	Linnut Aves
Lahko:	Pingviinilinnut Sphenisciformes
Suku:	†***Kairuku*** Ksepka, Fordyce, Ando & Jones, 2012

Lajit

- †*K. grebneffi* Ksepka, Fordyce, Ando & Jones, 2012
- †*K. waitaki* Ksepka, Fordyce, Ando & Jones, 2012 (tyyppilaji)

Katso myös

Kairuku Wikispeciesissä
Kairuku Commonsissa

Noudettu kohteesta ”https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kairuku&oldid=16440045”

Sivua on viimeksi muutettu 25. huhtikuuta 2017 kello 17.29.

Teksti on saatavilla Creative Commons Attribution/Share-Alike -lisenssillä; lisäehtoja voi sisältyä. Katso käyttöehdot.
Wikipedia® on Wikimedia Foundationin rekisteröimä tavaramerkki.
Ongelma artikkelissa?